

# Une construction combinatoire d'un automorphisme bidendriforme de $WQSym$



Journées Nationales du GDR IM 2022  
Hugo Mlodecki, hugo.mlodecki@gmail.com

## Motivation

L'algèbre  $WQSym$  est l'algèbre de Hopf indexée par les mots tassés.

$WQSym$  est une bigèbre bidendriforme [1, 2], c'est-à-dire que le produit et le coproduit peuvent être scindés en deux demi-produits ( $\prec, \succ$ ) et demi-coproduits ( $\Delta_{\prec}, \Delta_{\succ}$ ).

Corollaire immédiat[1]:  $WQSym$  et sa duale sont isomorphes car générées librement par leurs sous espaces des totalement primitifs.

Problèmes:

- Trouver des bases de l'algèbre et la duale compatibles avec la structure bidendriforme.
- Construire un isomorphisme entre ces bases.


$a_n := \dim(WQSym_n)$ ,  $p_n := \dim(Prim_n)$  et  $t_n := \dim(TPrim_n)$ :

$n$	1	2	3	4	5	6	OEIS
$a_n$	1	3	13	75	541	4 683	A000670
$p_n$	1	2	8	48	368	3 376	A095989
$t_n$	1	1	4	28	240	2 384	

## Mots tassés

· **Mot tassé**: toutes les lettres de 1 à son maximum  $m$  apparaissent au moins une fois.


123 132 213 231 312 321  
122 212 221 112 121 211  
111



## Descentes globales

· **Concaténation décalée**:  $121/21 = 34321$ .

· Tout mot  $w$  admet une unique **factorisation en descentes globales**  $w = w_1/w_2/\dots/w_k$  où tous les  $w_i$  sont dits **irréductibles**.




Irréductibles de taille  $n = \dim(Prim_n)$ .

## Nouvelles décompositions


· L'opération  $u \blacktriangleright v$ :  $2123 \blacktriangleright 322312 = 4345622612$

· Tout mot irréductible  $w$  admet une unique **factorisation rouge**  $w = u \blacktriangleright v$  avec la taille de  $u$  maximisée et  $v$  est dit **rouge irréductible**.



· L'opération  $u \blacktriangle v$ :  $2123 \blacktriangle 312312 = 6456421235$

· Tout mot irréductible  $w$  admet une unique **factorisation bleue**  $w = u \blacktriangle v$  avec la taille de  $u$  maximisée et  $v$  est dit **bleu irréductible**.




Irréductibles rouge de taille  $n = \dim(TPrim_n)$ .

Irréductibles bleu de taille  $n = \dim(TPrim_n)$ .


## Arbres biplans

·  $F_{RB}(\epsilon) := []$  (forêt vide),

·  $F_{RB}(w_1/w_2/\dots/w_k) := [T_{RB}(w_1), T_{RB}(w_2), \dots, T_{RB}(w_k)]$ ,



·  $T_{RB}(a \blacktriangleright (b \blacktriangle c)) := \text{Node}_{RB}(c, F_{RB}(a), F_{RB}(b))$ .



Les noeuds des arbres bicolores sont étiquetés par des mot **rouges et bleus irréductibles**.

## Bases de $WQSym$ et $WQSym^*$

On peut définir une base de  $WQSym^*$  indexée par des arbres biplans rouges.

$$\mathbb{P}_{\square} := \mathbb{R}_{\epsilon},$$

$$\mathbb{P}_{t_1, \dots, t_k} := \mathbb{P}_{t_k} \prec (\mathbb{P}_{t_{k-1}} \prec (\dots \prec \mathbb{P}_{t_1}) \dots),$$

[...]

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \begin{array}{c} 1,3 \\ \circ \\ \circ \end{array} &= \mathbb{P} \begin{array}{c} 1 \\ \circ \\ \circ \end{array} \prec \mathbb{P} \begin{array}{c} 1,3 \\ \circ \\ \circ \end{array} \\ &= (\mathbb{P}_{\circ} \succ \mathbb{P}_{\circ} - \mathbb{P}_{\circ} \prec \mathbb{P}_{\circ}) \prec \Phi_{1,3}(\mathbb{P}_{\circ}) \end{aligned}$$

•  $(\mathbb{P}_f)_{f \in \mathcal{F}_{Rn}}$  est une base de  $WQSym_n^*$ ,

•  $(\mathbb{P}_t)_{t \in \mathcal{T}_{Rn}}$  est une base de  $Prim_n^*$ ,

•  $(\mathbb{P}_t)_{t \in \mathcal{N}_{Rn}}$  est une base de  $TPrim_n^*$ .


Même construction sur  $WQSym$  avec une base  $\mathbb{O}$  indexée par des arbres biplans bleus.

Les bases  $\mathbb{O}$  et  $\mathbb{P}$  sont donc compatibles avec la **structure bidendriforme**.

## Une involution sur les mots tassés



Un échange des couleurs rouge et bleu de toutes les arêtes des arbres bicolores définit une involution sur les mots tassés.

Voici un exemple conséquent où l'on part d'un mot tassé  $w$  écrit en hexadécimal.




$w = DDDCCCEBBE9FA587653213449$

$w = ((111/111) \blacktriangleright (11 \blacktriangle 11)) \blacktriangleright (((14321/(((1/1) \blacktriangle 11) \blacktriangleright 11)) \blacktriangle 1321)$



$w' = (((111/111) \blacktriangle (11 \blacktriangleright 11)) \blacktriangle (((((1/1) \blacktriangleright 11) \blacktriangle 11)/14321) \blacktriangleright 1321)$

$w' = ECBDDDE7A9875F633422211145$



L'involution décrite ici définit un **isomorphisme bidendriforme** entre les bases  $\mathbb{O}$  et  $\mathbb{P}$ .

## Ouvertures

· L'involution décrite plus haut restreinte aux permutations ne correspond pas directement à l'inversion. Néanmoins, elle est **compatible avec l'inversion** en y ajoutant une étape.

· La **généralisation de la théorie des arbres biplans** à toutes les bigèbres bidendriformes permettrait d'obtenir de manière constructive un automorphisme des bigèbres bidendriformes.

· Les opérations  $\blacktriangleright$  et  $\blacktriangle$  font apparaître de façon inattendue deux nouvelles applications de l'**opérate de duplication gauche** appliquée sur des mots tassés.

· Le nombre d'arbres biplans à  $n$  noeuds est égal à la dimension de la composante homogène de la  **$L$ -algèbre libre à un seul générateur**.

## Références

- [1] L. Foissy: *Bidendriform bialgebras, trees, and free quasi-symmetric functions*, Journal of Pure and Applied Algebra (2007)
- [2] J.-C. Novelli, J.-Y. Thibon: *Polynomial realizations of some trialgebras*, (2006)
- [3] H. Mlodecki: *Bidendriform automorphism of  $WQSym$* , (2022+)

## Remerciements

Je remercie les personnes suivantes pour toute l'aide apportée à la réalisation (fond et forme) de ce poster:

Balthazar Charles, Loïc Foissy, Florent Hivert, Jean-Christophe Novelli, Viviane Pons, Daniel Tamayo.